



Síntesis de Noticias

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN

Viernes 9 de diciembre de 2022.

Esta información es proporcionada por la Secretaría de Salud Federal

Medios: Crónica, La Jornada, 24 Horas, Excélsior, Reforma, Reporte Índigo, La Razón.

La Cofepris no halla hongo en medicamentos analizados por brote de meningitis/Crónica

La Cofepris, encabezada por Alejandro Svarch, dio a conocer los resultados de los estudios técnicos a los medicamentos relacionados con el brote de meningitis registrado en el estado de Durango, analizados en el Laboratorio Nacional de Referencia de esa agencia sanitaria, con lo que, los primeros resultados ya han sido entregados a las propias autoridades de aquella entidad. En este sentido, es importante mencionar que el pasado jueves 1 de diciembre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell sostuvo que el origen del brote de casi medio centenar confirma dos con meningitis en pacientes embarazadas, la mayoría de ellas, había sido el hongo, *Fusarium solani*, versión que ha quedado descartada una semana después.

Aumenta producción de maíz pese a baja en uso de glifosato, afirman autoridades/La Jornada

Contra lo que plantean los grandes productores agrícolas y de plaguicidas, la reducción en el uso del glifosato que se ha dado en el país no ha llevado a la caída de la producción de maíz -en el cual se utiliza 35% de lo que se importa-, sino que creció al pasar de 27.3 millones de toneladas en 2020 a 28.9 millones estimadas para este año, pero además los agricultores han importado menos de la mitad de lo que se les ha autorizado. Las empresas interesadas en utilizar el glifosato defienden que la OMS ha dicho que “podría ser” cancerígeno, pero esta instancia tiene rezago de una década en la actualización de la información, sostuvo Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Entre los efectos que se han identificado están disfunción del sistema endocrino, daño al hígado y riñones, y puede ser precursor de anencefalia y con capacidad de ser cancerígeno, explicó.

Influenza tendrá pico de casos en enero, señalan expertos/24 Horas

Especialistas en Salud advirtieron que ante el incremento “indiscriminado” de casos en México, ya comienza a registrarse la ola de influenza de la temporada 2022 y 2023 y se espera que el pico se alcance en el mes de enero del próximo año. “Todavía estamos en una época ascendente de casos y probablemente hacia enero es cuando se alcance el punto máximo”, refirió el doctor Edgar Pérez Barragán, internista e infectólogo adscrito al IMSS. Alertó que la influenza no debe ser vista como una simple gripe, primordialmente en aquellas personas que tengan alguna otra enfermedad crónica como diabetes, hipertensión o pertenezcan a grupos vulnerables como adultos mayores.

Muertes por dengue incrementan 45%/Excélsior

Las defunciones por dengue en el país han aumentado 45% y los casos, 63%, en relación con el año pasado. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, en lo que va del año, se han confirmado 29 defunciones a causa de esta enfermedad, mientras que en el mismo periodo del año pasado se tenía el registro de 20. El más reciente informe semanal de vigilancia epidemiológica sobre el dengue detalla que, 156 defunciones por probable dengue se encuentran aún en estudio. En total, se tienen 56,301 casos acumulados, en tanto que en 2021, se registraban 34,490. El reporte indica que las defunciones confirmadas corresponden a Oaxaca, Sonora, Morelos, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Estado de México, Sinaloa y Veracruz. Sonora es la entidad con el mayor número de casos confirmados (2,176) seguida de Veracruz con 1,613; el Estado de

México con 1,281; Tabasco con 931 y Chiapas con 898 El dengue es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos hembras de las especies *Ae.aegypt* y *Ae.albopictus*.

Mueren diez personas con enfermedad renal y parálisis facial en Guanajuato/La Jornada, Excélsior, Crónica, Reforma

En el estado han muerto 10 de 15 pacientes renales que presentaron parálisis facial, informó el delegado estatal del IMSS, Marco Antonio Hernández Carrillo. El funcionario detalló que el 10 de octubre pasado se presentó el primer caso de este tipo y el 23 de noviembre, el último; “no es contagioso, no debe generar pánico, no es una situación que esté en el ambiente”, añadió. Hernández Carrillo puntualizó que las investigaciones sobre el tema están a cargo de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y de la dependencia sanitaria estatal, con apoyo del IMSS. Asimismo, la delegación estatal del instituto informó que los servicios en sus clínicas no están en riesgo por los casos de parálisis facial que se suscitaron en pacientes renales; además se trabaja con “estrictos protocolos de bioseguridad”, precisó.

Reverdece amapola en Triángulo Dorado/Excélsior

Los opioides representan la mayor carga de morbilidad atribuida a ese consumo; se estima que existen 31 millones de usuarios de opiáceos en el mundo, la gran mayoría de los cuales se encuentra en Asia; en este panorama general vale la pena mencionar que las incautaciones de heroína y morfina en América se duplicaron en los últimos 10 años, pero representan solo el 8% de las incautaciones globales. El 24 de junio de 2021, la Secretaría de Salud publicó un informe sobre la situación de la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. Entre otras constataciones, el informe indicó que alrededor del 40% de los consumidores de drogas había experimentado un aumento del consumo debido al estrés, la ansiedad o el aislamiento.

Aumentarán contagios simultáneos de COVID e influenza en invierno/La Jornada

Aunque no se prevé la aparición de nuevos virus respiratorios, el sistema de salud debe estar pendiente del incremento de estas infecciones en el primer trimestre de 2023, cuando tradicionalmente desciende la temperatura y aumenta la circulación de diferentes cepas, afirmó José Luis Sandoval, neumólogo del INER. Francisco Javier Saynes, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello, explicó que 95% de las infecciones respiratorias son causadas por virus, por lo que no se deben utilizar antibióticos. El especialista advirtió sobre la importancia de que, con base en la enseñanza que dejó la COVID, los afectados acudan al médico en los primeros días de síntomas.

A la vanguardia para tratar el cáncer/Reporte Índigo

En México, el carcinoma urotelial representa el 90% de los 9,587 casos reportados de cáncer de vejiga, lo cual lo convierte en el subtipo más común. Nora Sobrevilla Moreno, oncóloga médica, indica que este tipo de cáncer se origina en las células uroteliales que cubren el interior de la vejiga y conforme va creciendo se va infiltrando en las siguientes capas. “Una vez que se aloja en toda la capa muscular se origina la metástasis a órganos subyacentes hasta que se presenta la metástasis a distancia, debido al ADN tumoral circulante”, especifica Moreno. El tabaquismo es el factor de riesgo más importante asociado al cáncer de vejiga. Además del sangrado en la orina en esta enfermedad se presenta sintomatología irritativa, por ejemplo, ardor al momento de orinar y deseo constante de orinar.

Aprueba EU vacunar contra coronavirus a niños de 5 años o menos/La Jornada, La Razón, Reporte Índigo

Las autoridades reguladoras estadounidenses dieron ayer luz verde a la administración de dosis actualizadas de la vacuna contra COVID a niños menores de cinco años. La decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos busca proteger mejor a los más pequeños en medio del aumento de casos en todo el país, en un momento en que los hospitales infantiles se encuentran saturados de menores que padecen otras enfermedades respiratorias, incluida la influenza. “La vacunación es la mejor manera que conocemos para ayudar a prevenir las consecuencias graves la COVID, como la hospitalización y la muerte”, declaró el doctor Peter Marks, jefe de vacunas de la FDA. Las dosis de refuerzo contra la variante ómicron fabricadas por Moderna y su rival Pfizer ya estaban disponibles para todas las personas de cinco años o más. Ahora, la FDA autorizó el uso de las vacunas modificadas a partir de seis meses de edad, pero quién es elegible depende del número de dosis que haya recibido anteriormente y de qué tipo.