




**INCMNSZ**

# PRECAUCIONES PARA VÍA AÉREA

Utilice estas recomendaciones junto con las estándar en pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedades transmitidas por núcleos de gotas.

**1**

**Siempre mantenga la  
puerta cerrada.**



**Lávese las manos**  
con agua y jabón o con  
productos a base de alcohol.

**2**

**3**

**Utilice respirador N-95**  
antes de entrar al cuarto.




**De ser posible, coloque al paciente  
en área de presión negativa.**

**4**

**5**

**Si requiere trasladar al paciente notifique al servicio  
correspondiente y colóquele un respirador N-95.**



**Utilice lentes para proteger  
sus ojos** en caso de procedimientos  
que puedan generar salpicaduras o  
aerosoles, con sangre, líquidos  
corporales y/o secreciones.

**6**

## **Ejemplos:**

- Tuberculosis pulmonar y laríngea
- Sarampión
- Varicela (incluyendo zóster diseminado en paciente inmunocomprometido). Coloque además precauciones de contacto

## **Recomendaciones Adicionales**

- 1.- El cubrebocas de alta eficiencia debe ser un respirador efectivo (95%) ontra partículas menores de 1 micra.
- 2.- Utilice cuarto con presión negativa; están ubicados en el 2<sup>o</sup> piso: 241 a 248 en urgencias consultorios 7 y 8 anexo 1 a 5 y pisito 2 y 3. De no contar con éste, utilice una habitación individual ventilada.
- 3.- Traslade al paciente lo menos posible, en caso de requerirse notifique al servicio correspondiente y de ser posible colóquele el cubrebocas de alta eficacia (95%).
- 4.- Recuerde que el cubrebocas de alta eficiencia es de uso personal, su duración es de 40 horas de uso continuo, siempre y cuando no lo doble.

## **Precauciones Empiricas**

- Rash vesicular.
- Infecciones respiratorias (tos, fiebre, infiltrados pulmonares). Considerar.
- Rash maculopapular con coriza y fiebre.
- En sintomas de tos, fiebre, infiltrado pulmonar en pacientes con VIH.